

O'SAYOTGAN QUYONLARNING OVQAT HAZM QILISH FIZIOLOGIYASI

Fozilov Asliddin
Andijon davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'sayotgan quyonlarda ovqat hazm qilish sistemasi qay tarzda borilishi, anatomiyasi va kaekotrofiya haqida malumotlar keltirilgan. Quyonda ovqat hazm qilish anatomiyasining elementlari va ovqatlanish xatti harakati, shu jumladan kaekotrofiya Quyoning ovqat hazm qilish tizimi o'txo'r oziqlanishga, shu jumladan o'ziga xos moslashishga, tishlardan faol mikrobiota bilan kengaygan kaeko-kolik segmentiga va ko'r ichak hazm qilish zarralarini ajratishga moslashgan.

Kalit so'zlar: zelandiya oq quyoni, ph, kaekotrofiya, ovqat hazm qilish fiziologiyasi, ko'r ichak, mikrobiota.

Abstract: This article provides information on the development, anatomy and caecotrophy of the digestive system in growing rabbits. Elements of digestive anatomy and feeding behavior in the rabbit, including caecotrophy. adapted to separate particles.

Key words: Zealand white rabbit, ph, caecotrophy, digestive physiology, caecum, microbiota.

Аннотация: В этой статье представлена информация о том, как работает пищеварительная система, анатомия и цекотрофия у растущих кроликов. Элементы пищеварительной анатомии и пищевого поведения кролика, включая цекотрофию, адаптированные к разделению частиц.

Ключевые слова: Зеландский белый кролик, ph, цекотрофия, физиология пищеварения, слепая кишка, микробиота.

Ovqat hazm qilish tizimining buzilishi kattalarda emas, balki o'sayotgan quyonda uchraydi. Shunday qilib, bir nechta tadqiqotchilar ovqat hazm qilish fiziologiyasi (shu jumladan ovqatlanish xatti-harakati) va ovqat hazm qilish tizimining sog'lig'iga ta'siri o'rtasidagi munosabatni o'rgandilar. Ushbu kichik bo'lim 2 dan 6 haftagacha bo'lgan yosh quyoning ovqat hazm qilish fiziologiyasi bo'yicha so'nggi bilimlarni tavsiflashga qaratilgan, chunki bu sutdan ajratishni belgilaydigan asosiy davr va ovqat hazm qilish funktsiyalarining yetukligi juda faol. Bundan tashqari, ovqat hazm qilish tizimining etukligi bir necha naslchilik omillariga, masalan, sutdan ajratish yoshiga yoki 0,1 mm) ko'r ichakka orqaga qaytariladi (Björnhag, 1972). Qattiq qism, asosan katta o'z ichiga oladi oziqlantirishni cheklash, tasvirlangan

Quyonda ovqat hazm qilish anatomiyasining elementlari va ovqatlanish xatti harakati, shu jumladan kaekotrofiya Quyoning ovqat hazm qilish tizimi o'txo'r oziqlanishga, shu jumladan o'ziga xos moslashishga, tishlardan faol mikrobiota bilan kengaygan kaeko-kolik segmentiga va ko'r ichak hazm qilish zarralarini ajratishga moslashgan. Ovqat hazm qilish traktining umumiy tashkil etilishi (Lebas va boshqalar, 1997; Carabaño va boshqalar, 1998; Gidenne va Fortun-Lamothe, 2002; Gidenne va Lebas, 2005). keltirilgan

Boshqa sutemizuvchilardan farqli o'laroq, quyon oshqozonining pH darajasi har doim juda kislotali (1,5 dan 2,0 gacha) va kun davomida asosan tubida o'zgarib turadi. yumshoq najas mavjudligi. Oshqozon devoriga kiradigan bezlar xlorid kislotasi, pepsin va ba'zi ionlarni (Ca⁺⁺, K⁺, Mg⁺⁺ va Na⁺) chiqaradi. Ingichka ichak boshqa monogastrik sutemizuvchilar kabi ishlaydi, hazm qilish suyuqligi (8-10% DM), ayniqsa yuqori qismida. Ularning pH

darajasi yuqori qismida biroz asosli Bu erda faqat ovqat hazm qilish fiziologiyasi va ovqatlanish xatti harakatlarining ba'zi asoslari standart tijorat tizimlarida etishtirilgan uy quyonlari uchun berilgan. Batafsil ma'lumot so'nggi sharhlarda mavjud (Lebas va boshqalar, 1997; Carabaño va boshqalar, 1998; Gidenne va Fortun-Lamothe, 2002; Gidenne va Lebas, 2005). qismi (7,2-7,5) va yonbosh ichakning oxirida ko'proq kislota

(6,2 - 6,5). Ko'r ichak traktining eng katta qismidir (butun ovqat hazm qilish tarkibining 40%) va 100 dan 120 g gacha bir xil xamir aralashmasini (21-24% DM) o'z ichiga oladi.

Ko'r ichakning pH darajasi mikroorganizmlarning faolligiga va ovqatlanish tartibiga qarab 6,0 atrofida o'zgarib turadi. dunyo bo'ylab boshqa monogastrik uy sutemizuvchilari bilan bir xil. Quyonning o'ziga xosligi (va umuman *Lagomorpha*) proksimal ichakning ikki tomonlama funksiyasidir. Agar ko'richak tarkibidagi moddalar yo'g'on ichakka ertalab tushsa, ular kam biokimyoviy o'zgarishlarga uchraydi. Yo'g'on ichak devori shilimshiqni chiqaradi, bu esa devor qisqarishi natijasida hosil bo'lgan granularni asta-sekin o'rab oladi. Bu granular cho'zilgan klasterlarda to'planadi va yumshoq najas deb ataladi (ko'proq ilmiy jihatdan, kaekotroflar).

Agar ko'richak hazm qilish yo'g'on ichakka kunning boshqa vaqtida kirsa, proksimal yo'g'on ichakning faoliyati butunlay boshqacha bo'ladi. O'zgaruvchan yo'nalishdagi qisqarishning ketma-ket to'liqlari harakat qila boshlaydi; birinchisi tarkibni an'anaviy tarzda evakuatsiya qiladi, ikkinchisi esa ularni ko'r ichakka qaytaradi. Suyuq fraktsiyaning ko'p qismi (eruvchan mahsulotlar va kichik zarrachalar < 0.1 mm) ko'richakka qaytib keladi. (Björnhag, 1972). Qattiq qism, asosan katta o'z ichiga oladi. 03 mm dan ortiq uzunlikdagi zarralar, qattiq najas hosil qiladi. Bu yo'g'on ichakning ikki tomonlama ta'siri natijasida ikki turdagi najas hosil bo'ladi: qattiq va yumshoq, keyinroq oqsilga (bakterial kelib chiqishining yarmi) va suv-vitaminlariga (B va C) boy. Qattiq najaslar tashqariga chiqarilganda, yumshoq najaslar tashqariga chiqarilgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri quyon tomonidan anusda yutiladi.

Kaekotrofiyani koprofagiya bilan aralastirib yubormaslik kerak (hayvonlarda najas faqat bitta turi mavjud bo'lsa) chunki bu mikroob oqsilidan foyda olish uchun o'txo'r strategiya. Haqiqatan ham, yumshoq najas ertalabning oxirida umumiy oshqozon tarkibining to'rtidan uch qismini tashkil qiladi. Yo'g'on ichakning o'ziga xos ishlashi qo'pol ozuqalarni talab qiladi. Agar ozuqa tarkibida kichik zarrachalarning yuqori ulushi (<0,1 mm) bo'lsa, ularning aksariyati ko'richak tarkibidagi moddalar ko'r ichakka qaytariladi va ko'r ichak mikroflorasi uchun "oziq moddalar" bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Alus G., Edwards N.A. 1977. Development of the digestive tract of the rabbit from birth to weaning. Proc. of the Nutrition Society, 36, 3A.
2. Bellier R., Gidenne T., Vernay M., Colin M., 1995. In vivo study of circadian variations of the cecal fermentation pattern in postweaned and adult rabbits. J. Anim. Sci., 73, 128-135.
3. Berg R.D., 1996. The indigenous gastrointestinal microflora. Trends in Microbiology 4, 430-435.
4. Bernadac A., Moreau H., Verger R., 1991. Gastric lipase and pepsinogen during the ontogenesis of rabbit gastric glands. Europ. J. of Cellular Biology, 55, 149-157.
5. Björnhag G., 1972. Separation and delay of contents in the rabbit colon. Swedish J. of Agric. Res., 2, 125-136.