

ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА НА КРОВЬ У РАСТУЩИХ ХОМЯКОВ

Неъматова М.Т., Кимсанова Г.А.

Эралиева Г.А., Топилова Ф.М.

Андижанский государственный университет

Annotatsiya: Pb emissiyasining taniqli manbalariга эритиш ва қазиб олиш, батареялар, пигментлар ва керамика кирди. Ушбу металлнинг атроф-муҳитга кўпайиши ва унинг биологик парчаланмаслиги одамларга таъсир қилиш хавфини оширди. Pb таъсир қилишнинг асосий йўллари озиқ-овқат, ҳаво ва тамаки баргларида мавжудлиги сабабли ютиш ва нафас олишдир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) хавф туғдирадиган 10 та кимёвий моддалар ёки кимёвий моддалар гуруҳини эълон қилди.

Kalit so‘zlar. Саломатлик, механизмлар, *in vivo*, *in vitro*, мақсад, механизмлар, кўрғошин ацетати, қон тизими, ҳайвонлар.

Abstract: Well-known sources of Pb emissions include smelting and mining, batteries, pigments, and ceramics. The accumulation of this metal in the environment and its non-biodegradability have increased the risk of exposure to humans. The main routes of exposure to Pb are ingestion and inhalation due to its presence in food, air and tobacco leaves. The World Health Organization (WHO) has announced 10 chemicals or groups of chemicals that pose a risk.

Key words: Health care, mechanism, *in vivo*, *in vitro*, target, mechanism, lead acetate, system blood, animal.

Аннотация: К хорошо известным источникам выбросов Pb относятся плавка и добыча полезных ископаемых, батареи, пигменты и керамика. Накопление этого металла в окружающей среде и его небiorазлагаемость увеличили риск воздействия на человека. Основными путями воздействия Pb являются проглатывание и вдыхание из-за его присутствия в пищевых продуктах, воздухе и листьях табака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 10 химических веществ или групп химических веществ, которые представляют опасность..

Ключевые слова. Здравоохранения, механизмов, *in vivo*, *in vitro*, мишень, механизм, ацетата свинца, систему крови, животных.

Свинец как загрязнитель окружающей среды и классический токсичный агент остается в центре внимания экологов, токсикологов, гигиенистов, морфологов и клиницистов различных областей медицины и биологии [1, 6, 8]. Об этом свидетельствует тот факт, что за сравнительно короткий период количество этого потенциально токсичного химического вещества в окружающей среде увеличилось в десятки, а то и сотни раз и стало глобальной проблемой [5, 10]. Хорошо известными источниками выбросов Pb являются отрасли, связанные с выплавкой и добычей полезных ископаемых, производством аккумуляторов, пигментов и керамики. Увеличение выбросов этого металла в окружающую среду и его небiorазлагаемость увеличили риск воздействия на человека. Основными путями воздействия Pb являются глотание и ингаляция из-за его присутствия в пище, воздухе и листьях табака [5, 10.] Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список из 10 химических веществ или групп химических веществ, представляющих опасность для здоровья человека, в который входит Pb [11]. Кроме того, Агентство США по регистрации

токсичных веществ и заболеваний (ATSDR) поставило Pb на второе место в приоритетном списке опасных веществ[3].

Для определения точных механизмов токсичности Pb было проведено множество исследований *in vivo* и *in vitro*. Современный объем знаний предполагает, что окислительный стресс является одним из важнейших механизмов токсичности этого металла, хотя он не является металлом Фентона[4, 7].

После абсорбции Pb распределяется в организме через эритроциты или белки[9]. Когда Pb попадает в клетку, большая его часть связывается с гемоглобином, а не с мембраной эритроцитов[2]. Система кроветворения является одной из наиболее чувствительных систем, а кровь представляет собой не только способ транспортировки, но и критическую мишень токсичности Pb[2]. Свинец может привести к анемии по различным механизмам[4].

Цель: изучение ацетата свинца на систему крови

Опыт: Работа выполнена в лаборатории частной клиники “Andijon Tibbiy Diagnostika” на потомстве золотистых сирийских хомяков на 30- и 45-е сутки постнатального периода развития.

В соответствии с поставленными задачами животные разбивались на две группы. Первую группу животных составили хомячата с физиологически нормально протекающим развитием (контроль). Вторую группу животных составили хомячата, перорально получавших ацетат свинца в период постнатального развития на 25-е сутки в дозе 5 мг/кг (опыт). Возраст хомячат устанавливался со дня их рождения.

С момента рождения потомства хомяков проводились наблюдения за их поведением и развитием. Производили взвешивание крысят. Материалом исследования служила кровь в 30- и 45-е сутки постнатального периода развития.

У животных определяли общее количество эритроцитов унифицированным методом подсчета в счетной камере Горяева, концентрацию гемоглобина определяли методом Сали с использованием стандарта гемиглобинцианида, измеряли гематокрит после центрифугирования крови в гепаринизированных капиллярах на центрифуге

Результаты: исследования цельной крови показали, что под влиянием ацетата свинца у животных в экспериментальной группе в 30-е сутки наблюдается увеличение эритроцитов на 10%, лейкоцитов на 5% а в 45-е сутки их количество уменьшается на 18,5% и увеличивается на 23% соответственно, чем у животных контрольной группы. Наблюдается уменьшение числа тромбоцитов, количества гемоглобина, и гематокритного числа в обеих группах опыта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abadin, H.; Ashizawa, A.; Stevens, Y.W.; Llados, F.; Diamond, G.; Sage, G.; Citra, M.; Quinones, A.; Bosch, S.J.; Swarts, S.G. *Toxicological Profile for Lead*; Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US): Atlanta, GA, USA, 2007.
2. Abadin, H.; Ashizawa, A.; Stevens, Y.-W.; Llados, F.; Diamond, G.; Sage, G.; Citra, M.; Quinones, A.; Bosch, S.J.; Swarts, S.G. *Toxicological Profile for Lead*; The United States Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Atlanta, GA, USA, 2007; p. 582.
3. ATSDR. Available online: <https://www.atsdr.cdc.gov/spl/> (accessed on 26 September 2018).

4. Flora, G.; Gupta, D.; Tiwari, A. Toxicity of lead: A review with recent updates. *Interdiscip. Toxicol.* **2012**, *5*, 47–58. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
5. Grant, L.D. Lead and compounds. In *Book Environmental Toxicants: Human Exposure and Their Health Effects*, 3rd ed.; Lippmann, M., Ed.; Wiley-Interscience: Hoboken, NJ, USA, 2009; pp. 757–809. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
6. Levitin, Y.Y.; Vedernykova, I.O.; Koval, A.O.; Kryskiv, O.S. Toxic influence of metals and their compounds. In *Bioaktyvnistneorhanichnykhspoluk: Navch. Posibn. Dliaaudytornoita Samostiinoirobotystudentiv*; NfaU: Kharkiv, Ukraine, 2017; pp. 63–81. [[Google Scholar](#)]
7. Matović, V.; Buha, A.; Dukić-Ćosić, D.; Bulat, Z. Insight into the oxidative stress induced by lead and/or cadmium in blood, liver and kidneys. *Food Chem. Toxicol.* **2015**, *78*, 130–140. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
8. Rybchenko, A.A.; Kiku, P.F.; Shabanov, A.G.; Kryzhanovsky, S.P.; Yarygina, M.V. Assessment of neurophysiological functions of the central nervous system when exposed to lead. *Ekolohyia Cheloveka* **2016**, *2*, 8–12. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
9. Timchalk, C.; Lin, Y.; Weitz, K.K.; Wu, H.; Gies, R.A.; Moore, D.A.; Yantasee, W. Disposition of lead (Pb) in saliva and blood of Sprague-Dawley rats following a single or repeated oral exposure to Pb-acetate. *Toxicology* **2006**, *222*, 86–94. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
10. Tkachyshyn, V.S. Intoxications by Lead and its Inorganic compounds. *Emerg. Med.* **2022**, *4*, 6–12. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]