

СЕКРЕЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

Юлдашева Гулмира Адиловна.

Андижанский государственный университет имени З.М. Бабура.

Annotatsiya: Belgilangan yo‘nalishda katta hajmdagi ma’lumotlarning mavjudligi oshqozon osti bezi proteolitik fermentlarining oshqozon osti bezi sekretsiyasiga ta’siri bo‘yicha kichik miqdordagi tadqiqotlarni o‘tkazishga imkon berdi. Ushbu tajribalarning asosiy vazifasi o‘n ikki barmoqli ichak fermentlarining tuzatuvchi ta’siri prinsipini, bu ta’sirlarning selektiv tabiatini umumlashirishga va iloji bo‘lsa, zimogen va faollashtirilgan fermentlarning ta’siridagi farqlarni ko‘rsatishga imkon beradigan materialni taqdim etishdan iborat edi. proteinazlar.

Kalit suzlari: Har xil, bezlar, o‘n ikki barmoqli ichak, inhibe, oshqozon osti bezi, fermentlar, zimogen, sekretsiya, proteinazlar, temporallik

Abstract: The availability of a large amount of data in the specified direction has made it possible to conduct a small number of studies on the effect of pancreatic proteolytic enzymes on pancreatic secretion. The main task of these experiments was to present the principle of the corrective action of duodenal enzymes, to summarize the selective nature of these effects and, if possible, to show the differences between the effects of zymogenic and activated enzymes. proteinases.

Keywords: Miscellaneous, Glands, Duodenum, Inhibition, Pancreas, Enzymes, Zymogen, Secretion, Proteinases, Temporal

Аннотация: Наличие большого количества данных по указанному направлению позволило провести небольшое количество исследований по влиянию панкреатических протеолитических ферментов на панкреатическую секрецию. Основной задачей этих экспериментов было представить принцип корригирующего действия ферментов двенадцатиперстной кишки, обобщить избирательный характер этих эффектов и, по возможности, показать различия между эффектами зимогенных и активированных ферментов. протеиназы.

Ключевые слова: Разное, Железы, Двенадцатиперстная кишка, Торможение, Поджелудочная железа, Ферменты, Зимоген, Секреция, Протеиназы, Временные.

В обзоре литературы было приведено большое число работ, в которых в экспериментах на различных животных и в наблюдениях на людях исследовалась секреция поджелудочной железы при введении в двенадцатиперстную кишку различных панкреатических протеиназ и отмечалось при этом торможение секреции.

На основании этих результатов сделано заключение о том, что торможение секреции поджелудочной железы введением её сока в двенадцатиперстную кишку обусловлено влиянием на дуоденальную слизистую оболочку именно зимогенных и активированных протеиназ поджелудочного сока. Позже было показано, что введение в двенадцатиперстную кишку трипсин и химотрипсин тормозят панкреатическую секрецию протеиназ.

Наличие большого числа данных изложенного направления позволило нам выполнить небольшой объем исследования влияния панкреатических протеолитических

ферментов на секрецию поджелудочной железы. Эти эксперименты имели основной задачей представить материал, позволяющий обобщить принцип корректирующих влияний ферментов из двенадцатиперстной кишки, селективный характер этих влияний, по возможности показать различия во влияниях зимогенных и активированных протеиназ.

Из представленных в таблице 1 данные видно, что введение в двенадцатиперстную кишку трипсина снижало объем секрета, понижало протеолитическую активность сока и дебит секреции протеиназ поджелудочной железы. В последующие после введения трипсина два часа опыта (II) все показатели секреции не имели достоверных отличий от контрольных величин. Следовательно, трипсин в своем действии с двенадцатиперстной кишки отличался не только селективностью, но и кратко временностью действия. В уменьшении дебита секреции протеаз определенное значение имело и снижение объема сока. Трипсиноген проявил селективное тормозное действие на секрецию панкреатических протеиназ без изменения объема секрета. При этом концентрация общего белка в соке понизилась. Эффект трипсина можно было наблюдать и в его последствии - в два последующих часа дебита секреции и концентрация протеиназ в соке были существенно пониженными.

Мало чем эффект трипсиногена отличается от эффекта химотрипсина.

Он был селективным, т.е распространяется только на секрецию панкреатических протеиназ и сохраняется с часы поле действия.

Следовательно, из полученных данных видно, трипсиноген и химотрипсин, в отличии от трипсина обладает более селективным действием, не изменяет объем и это действие более длительное, продолжается и после прекращения интрадуоданальной инфузии трипсиногена и химотрипсина

Таблица 1.

Вводимые в двенадцатиперстную кишку протеиназы	Время опытов	Объем сока	Бикарбонаты	Белок	Амилаза	Липаза	Протеиназы
Трипсин	I	83,8±7,0*	$\frac{129,9 \pm 18,9}{103,8 \pm 18,1}$	$\frac{112,7 \pm 24,5}{95,8 \pm 21,7}$	$\frac{138,9 \pm 21,0}{111,2 \pm 15,6}$	$\frac{104,9 \pm 2,4}{89,4 \pm 8,5}$	$\frac{66,1 \pm 6,1 *}{53,5 \pm 5,4 *}$
		113,1±15,9	$\frac{92,1 \pm 18,7}{80,0 \pm 9,9}$	$\frac{133,6 \pm 29,0}{159,3 \pm 68,4}$	$\frac{135,5 \pm 21,4}{126,3 \pm 20,1}$	$\frac{98,1 \pm 5,4}{109,5 \pm 13,4}$	$\frac{92,9 \pm 11,4}{10,3 \pm 15,0}$
Трипсиноген	I	97,2±7,8	$\frac{105,1 \pm 4,1}{100,9 \pm 5,1}$	$\frac{80,7 \pm 7,6 *}{88,5 \pm 12,2}$	$\frac{102,3 \pm 10,1}{104,1 \pm 17,7}$	$\frac{97,6 \pm 2,6}{94,5 \pm 6,3}$	$\frac{55,7 \pm 4,5 *}{54,2 \pm 5,7 *}$
		94,5±2,6	$\frac{106,5 \pm 8,9}{100,0 \pm 7,0}$	$\frac{82,9 \pm 7,7}{80,8 \pm 8,4}$	$\frac{104,8 \pm 10,3}{101,1 \pm 12,4}$	$\frac{95,3 \pm 3,7}{90,9 \pm 5,5}$	$\frac{79,9 \pm 4,8 *}{75,2 \pm 6,4 *}$
Химотрипсин	I	94,6± 11,5	$\frac{70,8 \pm 24,8}{66,9 \pm 25,7}$	$\frac{91,8 \pm 18,4}{87,7 \pm 11,2}$	$\frac{145,2 \pm 44,7}{128,5 \pm 41,4}$	$\frac{95,2 \pm 3,2}{88,0 \pm 6,7}$	$\frac{54,0 \pm 7,7 *}{48,0 \pm 5,5}$

	II	$137,3 \pm 38,6$	$77,8 \pm 28,0$ $88,0 \pm 28,0$	$30,2 \pm 14,3$ $110,3 \pm 29,7$	$107,0 \pm 29,6$ $102,0 \pm 17,2$	$93,1 \pm 4,8$ $129,8 \pm 36,2$	$68,1 \pm 7,8$ $80,4 \pm 15,9$
--	-----------	------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Влияние введения в двенадцатиперстную кишку протеиназ на секрецию поджелудочной железы (в процентах к показателям секреции до введения протеиназ, $M \pm m$)

Примечание: числитель - концентрация и активность компонентов сока, Знаменатель - дебит их секреции, * - достоверность отличающиеся показателей, I - в час введения протеиназ; II - в две последующих часа

Использованные литературы:

1. Коротько Г.Ф., Введение в физиологию желудочно-кишечного тракта. - Ташкент: Медицина, 1987. - 221 с.
2. Алейник В.А., Бабич С.М., Маликов Т.М. «Роль печени в механизмах регуляции поджелудочной железы». / Молодежь и медицинская наука в XXI веке. Материалы VIII-ой итоговой открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием. Киров- 2003, Стр. 101.
3. Елецкий Ю.К., Яглов В.В. Эволюция структурной организации эндокринной части поджелудочной железы позвоночных. - М.: Наука, 1978. - 165 с.
4. Зуфаров К.А., Особенности секреторного цикла ацинарных клеток при экспериментальных и патологических условиях. В кн.: Ферментовыделительная деятельность пищеварительных желез и ее регуляция. - Ташкент: Медицина, 1974.-С. 100-102.