

## ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЭКСПЛАНТОВ РАСТЕНИЯ *PHYSALIS ALKEKENGII*

Кадилова З.А., Ташмухамедова Ш.С.,  
Абдувохидов С.Н., Зиёдов О.Т., Кодирова З.А., Турдиева Н.Б.  
Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека

В настоящее время метод клонального микроразмножения наиболее широко применяется для оздоровления растений, зараженных вирусами. Для успешного клонального микроразмножения растений необходим комплекс специально оборудованных помещений, включающий комнаты для стерилизации питательной среды и мойки посуды; боксы для изоляции, пересадки тканей и деления растений; термостатную для выращивания изолированных тканей на питательных средах и получения растений-регенерантов; оранжереи для выращивания и размножения маточных растений.

В данной работе анализированы оптимальные и эффективные методы микроклонального размножения *in vitro* лекарственного растения *Physalis alkekengi* с целью получения здорового, безпатогенного посадочного материала. Следует отметить, что, в результате экологических изменений фитопатогенные вирусы поражают различные лекарственные, редкие и эндемичные растения, а также наносят серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам. Заражение вирусом приводит к изменению физиологических процессов в этих растениях и снижению продуктивности. Вирусные патогены отрицательно влияют на рост и развитие лекарственных растений, а также на их лечебные свойства. Стоит отметить, что применение пестицидов, ядохимикатов против вирусов не всегда дает положительный эффект, и эти вещества могут нанести серьезный ущерб биосфере. Поэтому при микроклональном размножении лекарственных растений, том числе *Physalis alkekengi*, и создании здорового безвирусного растения подбор оптимальных условий имеет важное значение.

В настоящее время в современной биотехнологии широко применяются методы клеточной инженерии растений для получения здоровых и без патогенов растений. Под клеточной инженерией растений понимают культивирование в асептических условиях среды вне организма (*in vitro*) изолированных клеток и тканей, а также различные манипуляции с ними (слияние, размножение и др.). Культура клеток и тканей растений *in vitro* основана на трех принципах: 1) необходимости изолирования экспланта от материнского растения; 2) культивировании экспланта в регулируемых условиях, определяемых химическим составом питательной среды, а также физическими условиями; 3) выполнении всех работ по культивированию клеток и тканей в стерильных условиях [1].

Существуют много приемов клонального микроразмножения, активацией пазушных меристем, инициацией образования адвентивных побегов тканями экспланта, инициацией возникновения адвентивных побегов в каллусе, индукцией соматического эмбриогенеза в клетках экспланта, инициацией соматического эмбриогенеза в каллусной ткани, инициацией формирования придаточных эмбриоидов в ткани первичных соматических зародышей [2].

При клональном микроразмножении лидирующими факторами являются подбор условия стерилизации растений, подбор размера экспланта, подбор и состав питательной среды. Выживаемость и продуктивность растения размноженного микрклональными методами зависит от многих факторов, таких как влага и температура, и по составу почвы и их стерильности.

Необходимым условием работы с культурой изолированных тканей является соблюдение строгой стерильности, т.к. богатая питательная среда является прекрасным субстратом для развития в ней микроорганизмов, а изолированные от растений фрагменты (экспланты) легко подвержены микробной контаминации, следовательно, стерилизации должны подвергаться и экспланты, и питательные среды.

Основные факторы для повышения эффективности стерилизации эксплантов растения являются концентрация гипохлорита натрия, раствор этанола и перекиси водорода, также промывание эксплантов растения в стерильной воде. В данной работе после окончания стерилизации готовые стерильные экспланты растения *Physalis alkegeni* помещали в питательную среду и инкубировали (Рис.1, А, Б).



Рис.1, А, Б. Посев эксплантов растения *Physalis alkegeni* в питательную среду и инкубация в термостате.

Результаты исследования показали, что 4-5 дни после культивирования эксплантов, в 2 чашках Петри из 6 были зараженные грибами (33%). В 4 чашках рост грибов не наблюдались (66%). Рост стебля и корней начали развиваться на 10 день после посадки на питательную среду, а полностью растения формировались через 18-20 дней. Чтобы достичь 100% эффективности стерилизации и культивирования, далее мы стерилизовали экспланты растения в разных концентрациях гипохлоритом натрия. Результаты показали, что стерилизация эксплантов растения в 2% растворе гипохлорита натрия положительно влияют на рост и формирования эксплантов.

#### Литература

1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе: Учеб.пособие.– М.: ФБК-ПРЕСС, 1991. – 160 с.
2. Aniel Kumar O, Jyothirmayee G, Subba Tata S (2011). In vitro plant regeneration from leaf explants of *Withania somnifera* (L) Dunal (Ashwaganda) - an important medicinal plant. *Research in Biotechnology* 2:34-39.