

## **ГИПОКИНЕЗИЯ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФЕРМЕНТНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИНСОЛЯЦИИ**

**Мирзарахимова Марина Анваржановна,  
Кадилов Шакир Кадилович  
Андижанский Государственный медицинский институт**

Физический труд в его чистом виде, вызывающий лишь увеличение энергетических затрат, сегодня имеет место сравнительно редко. Как правило, любой труд сопровождается возрастанием нервного напряжения на фоне уменьшающихся затрат мышечных усилий. Естественно, что при этом возрастают ответственность рабочего и величина нервного напряжения на фоне резкого уменьшения физического труда, что способствует развитию гипокинезии, [1,5]

Исследования, проведенные нами показали, что длительное уменьшение уровня физической активности при действии высокой температуры и инсоляции, вызывает значительное снижение энергозатрат, что приводит к уменьшению скорости синтеза микроэргов, разобщению окисления и фосфорилирования, изменению общего газообмена, снижению силы мышц и работоспособности, а также понижению функций мышечных волокон, что сопровождается снижением метаболизма и активности ферментов, преобладанием процессов катаболизма, уменьшением мышечной массы, потерей массы тела и силы мышц. Нарушение трофической регуляции, в свою очередь вызывает нарушение функций высшей нервной деятельности, повышение продукции АКТГ, стимуляцию, а затем истощение функции надпочечников, снижение реактивности и общую астенизацию организма, [4].

Секреторная функция поджелудочной железы у крыс, в условиях гипокинезии, высокой температуры и инсоляции зависела от длительности эксперимента. В зависимости от длительности действия этих факторов были разные изменения активности амилазы в ткани поджелудочной железы. [2,3].

Уровень активности амилазы в ткани поджелудочной железы и в крови по-разному реагируют на влияние комплекса стресс факторов как гипокинезия, высокая температура и инсоляция, т.к. источником амилазы крови является не только поджелудочная железа, но и слюнные железы.

Эти реакции в основном зависят от длительности действия этих факторов и проявляются в виде увеличения или уменьшения активности этого фермента в неодинаковой степени как в ткани поджелудочной железы так и в крови.

Липолитическая активность ткани поджелудочной железы и крови осталась без изменений либо снижалась. Сочетанное воздействие гипокинезии, высокой температуры и инсоляции ингибирует (подавляет) секрецию липазы из поджелудочной железы. При этом экзосекреция поджелудочной железы нарушается в меньшей степени, чем увеличение инкреции ее в кровь, что зависит в основном от времени одновременного действия трех стрессовых факторов.

При сочетанном влиянии гипокинезии, высокой температуры и инсоляции содержание общего белка в зависимости от длительности действий этих факторов, в ткани поджелудочной железы содержание общего белка изменяется разнонаправлено.

Подытоживая полученные результаты, становится возможным сделать следующие выводы:

1. Адаптационные реакции секреторного процесса (экзосекреции и инкреции) зависят от длительности и сложности стресс факторов.

2. При кратковременном сочетанном воздействии гипокинезии, высокой температуры и инсоляции усиливается секреция и инкреция амилазы.

3. При сочетанном воздействии этих факторов, снижается секреция и особенно инкреция (весь период эксперимента) липазы поджелудочной железы.

4. В зависимости от длительности одновременного влияния трех факторов стресса, содержание общего белка в ткани поджелудочной железы либо увеличивается, либо уменьшается. Содержание его в крови во всех сроках эксперимента уменьшается.

**Список использованной литературы:**

1. Гридин Л.А. Коррекция и неблагоприятные эффекты гипокинезии методом локальных тепловых воздействий. Врач –М., 2000. -№9. С. - 33-35.

2. Коротько Г.Ф. Секреция поджелудочной железы.–Краснодар: Кубанский гос. мед. университет, 2015. – С.- 312

3. Коротько Г.Ф. Рециркуляция ферментов пищеварительных желез // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2011.–№4. – С.- 14-21.

4. Саимова А.Ж. Влияние ионизирующего излучения на двигательную активность живого организма в экстремальных условиях //Диссертация, д.ф. (PhD). – Ташкент, 2017. – С.60-57.

5. Нарымбетова Т.М., Орманбаев К.С., Байзакова Б.У., Мухабетов Н.М., Акилбеков Б.А., Рахметова З.К. Гипокинезия и гиперкинезия как факторы риска в экстремальных условиях // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 5. – С. 64-66.