

ФИЗИОЛОГИЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

Шухратова Зарнигор Фархадовна
Андижанский государственный
университет

Аннотация: Тезис посвящен изучению физиологии регуляции дыхания у человека. В работе обсуждаются основные механизмы, контролирующие дыхание, включая роль хеморецепторов и механорецепторов, а также центры управления в головном мозге.

Abstract: The thesis is devoted to the study of the physiology of respiratory regulation in humans. The paper discusses the basic mechanisms that control breathing, including the role of chemoreceptors and mechanoreceptors, as well as control centers in the brain.

Ключевые слова: дыхательный центр, механорецепторы, центральные хеморецепторы, периферические хеморецепторы.

Конечная цель регуляции дыхания или полезный приспособительный результат – поддержание постоянного газового состава и рН артериальной и венозной крови. Отклонение этих показателей от нормы (PO_2 менее 10 мм.рт.ст., PO_2 более 40 мм.рт.ст., рН от 7,36) воспринимается как стимул. Дыхательный центр – это группа нейронов, образующих центры вдоха (инспираторные) и выдоха (экспираторные). Она локализуется в продолговатом мозге. Это установлено в опытах с перерезкой ствола мозга, приведенных французским физиологом Легаллуа в 1812 г. Дыхательные центры также находятся в коре, который участвует в произвольном дыхании. Продолговатый мозг состоит из двух дыхательных групп: дорсальный и вентральный. В дорсальной группе сосредоточены инспираторные нейроны, посылающие аксоны в шейные сегменты спинного мозга, где они синаптически оканчиваются на мотонейронах ядра диафрагмального нерва. Ядра вентральной группы дыхательных ядер содержат и инспираторные, и экспираторные нейроны. Они связаны синаптически с теми нейронами спинного мозга, которые иннервируют межреберные мышцы. Также в дыхание участвует и варолиев мост, состоящий из пневматического и апнейстического центра. Они регулируют продолжительность фаз вдоха и выдоха, а также паузу между ними.

А как происходит возбуждение нейронов?

Возбуждение нейронов происходит в процессе механических и химических воздействий. За счёт механических воздействий возбуждаются механорецепторы, которые в основном регулируют работу скелетных мышц, участвующих в процессе дыхания. А за счёт химических воздействий возбуждаются хеморецепторы.

Хеморецепторы бывают двух видов:

1. Центральные хеморецепторы, расположенный в продолговатом мозге и реагирует на снижение концентрации рН и на повышение концентрации CO_2 в крови.
2. Периферические хеморецепторы, которые располагаются в дуге аорты и синокаротиноидной области. Они реагируют на снижение концентрации O_2 , например при гипоксии.

Таким образом, центром управления дыхания является – продолговатый мозг, а центром произвольного – кора. Сосудистые хеморецепторы реагируют преимущественно на снижение уровня кислорода в крови, а центральные – на изменение

в крови и спинномозговой жидкости рН и PCO_2 . А также некоторые гормоны такие как адреналин, прогестерон при беременности усиливают дыхания.

Список литературы:

1. Г.И.Косицкий. – Физиология человека 1985-560 стр.
2. М.А.Агаджанян, В.М.Смирнов – Нормальная физиология 2012-576 стр.