



"AS LUPINUS" TARKIBIDAGI OQSILLAR MIQDORINI
ANIQLASH

¹Asqarov Ibrohim Rahmonovich., ²Mamatqulova Surayyo Abdusamatovna.,
³Abdujabborova Charosxon Sanjarbek qizi

¹Andijon davlat universiteti., ²Farg'ona davlat universiteti., ³Farg'ona jamoat
salomatligi tibbiyot instituti.

Maqola haqida ma'lumot
Qabul qilingan: 02.06.2024
Qayta qabul : 10.06.2024
Saytda mavjud : 12.06.2024

Muallif (lar)
I.A.Asqarov
S.A.Mamatqulova
*Ch.S.Abdujabborova

Muallif bilan aloqa

abdujabborovacharosxon55@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-3150-3039>

© I.A.Asqarov va boshqalar

UNIVERSAL xalqaro ilmiy jurnal

Ochiq ma'lumotlar:

<https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal>

Maxfiylik bayonoti

Materialni istalgan vosita yoki formatda nusxalash va qayta tarqatish hamda maqoladan to'g'ri iqtibos keltirish va litsenziyasini ko'rsatish sharti bilan istalgan maqsadda foydalanish mumkin.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda uchraydigan Yapon saforasi daraxtining mevasi va bargi, hamda Lupin o'simligining doni 1:1 nisbatdagi aralashmasidan tashkil topgan "As Lupinus" nomli biologik faol moddaning tarkibidagi biologik faolligini aniqlash maqsadida suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida aralashma tarkibidagi aniqlangan oqsillar miqdori haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Yapon saforasi (*lat. Styphnolobium japonicum*), Lupin (*lat. Lupus*), tibbiyot, oziq-ovqat, farmatsevtika, kosmetologiya, xalq tabobati, kimyoviy tarkibi, oqsil, Keldal usuli.

Аннотация: В данной статье речь идет о количестве белков, обнаруженных в смеси методом жидкостной хроматографии с целью определения биологической активности биологически активного вещества под названием "As Lupinus", состоящего из смеси плодов и листьев японского сафлорового дерева, встречающегося в Узбекистане, и зерна растения люпин в соотношении 1:1.

Ключевые слова: Японский сафлор (*лат. Styphnolobium japonicum*), Люпин (*лат. Lupus*), медицина, пищевая, фармацевтика, косметология, народная медицина, химический состав, белок, метод Кьельдаль

Annotation: This article talked about the amount of proteins found in the mixture using the liquid chromatography method in order to determine the biological activity of a biologically active substance called "As Lupinus", consisting of a mixture of the fruit and leaf of a Japanese saffron tree found in Uzbekistan, and the grain of a lupine plant in a ratio of 1:1.

Keywords: Japanese safflower (*Lat. Styphnolobium japonicum*), Lupin (*Lat. Lupus*), medicine, food, pharmaceuticals, cosmetology, traditional medicine, chemical composition, protein, Kjeldahl method.



KIRISH: Oqsillarni nafaqat go'sht va sut mahsulotlaridan, balki o'simliklardan ham olish mumkin. Bu ozishga va salomatlik bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi. Oqsillar immunitet ishlab chiqilishi, asab impulslarining uzatilishi, hujayralarning o'sishi, rivojlanishi va qayta tiklanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari u qorinni yaxshi to'ydiradi. Umuman olganda, ularsiz yashab bo'lmaydi. O'simliklarda oqsillar go'sht va sut mahsulotlariga qaraganda ancha kamroq miqdorda mavjud. Shunga qaramasdan, o'simlik oqsillarining tarkibi zarur aminokislotalar to'plamidan tashkil topgan, demak organizmning oqsillarga bo'lgan ehtiyojini qisman yoki to'liq qondira oladi. Ko'pincha ortiqcha vazndan qutulishga harakat qiluvchi kishilar hayvon oqsillaridan voz kechadi. O'simliklardan tayyorlangan ovqatlarning kaloriyasi va yog'i kamroq bo'ladi, shuning uchun ko'pchilik aynan uni tanlaydi.

Lekin uzoq vaqt davomida faqat sabzavotlar bilan ovqatlanish tufayli oqsillar yetishmasligi yuz berishi mumkin. Shuning uchun o'simlik oqsillarini iste'mol qilish — bu sog'liqqa ziyon yetkazmasdan ozishning garovi hisoblanadi. Ko'pchilik hayvonlarga achinganidan vegetarianga aylanadi. Odam organizmi go'shtsiz yoki hayvonlardan olinadigan oziq-ovqatlarisiz yashashi mumkin, lekin oqsillarsiz yashay olmaydi. Shuning uchun o'simlikli parhezni tanlaganlar ularni boshqa manbalardan oladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI: Yapon saforasi yoki stifnolobium japonica (*lat. Styphnolobium japonicum*) bargli daraxt; dukkaklilar (*Fabaceae*) oilasining *Stifnolobium* (*Styphnolobium*) jinsining turi. Balandligi 25 m gacha bo'lgan daraxt keng

sharsimon toj bilan. Har yili iyul —avgust oylarida gullaydi. Mevasi tiniq qalinlashgan, dastlab yashil-jigarrang, pishganida esa qizg'ish, uzunligi 3-8 sm bo'lgan suvli, ochilmagan silindsimon loviya. Mevalar sentyabr-oktyabr oylarida butun daraxtda pishadi. Tarkibida rutin, glikozid, oshlovchi moddalar, alkaloidlar, organik kislotalar, darmon-dori — C (askorbin kislotasi) mavjud. Urug'ida 10 % yog'simon moy bor. "Rutin" preparati kurtaklardan olinadi. Sofora nektarida shakar konsentratsiyasi o'rtacha 50% ni tashkil qiladi. Nektarda glyukoza ko'p.

Lupin (lotincha *Lupus* so'zidan bo'lib, bo'ri degan ma'noni anglatadi) dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik, ikki yillik va ko'p yillik ildizpoyali o'simliklar turkumi. O'tlilar ko'proq, butalar kamroq tarqalgan. Ushbu turdagi o'simlik 200 dan 1000 gacha turli xil namunalarga ega (turli manbalarga ko'ra) va dunyoning turli burchaklarida o'sadi, ko'pincha Shimoliy Amerika va O'rta er dengizida uchraydi. O'zbekistonda kolleksiya ekinzorlarida ustiri-ladi. Ildizi o'qildiz. Poyasi o'tsimon, shoxlanadi, balandligi 1,5 m gacha boradi. Bargi panjasimon, yirik, bandli. To'pguli shingil. Sariq Lupin guli xushbo'y. Turlariga qarab gulining rangi har xil. Mevasi ko'p urug'li dukkak.

Xalq tabobatida Yapon soforasi qon bosimi ko'tarilganida, ichburug', oshqozon (me'da) va o'n ikki barmoqli ichak yarasida, ichki qon ketishida ijobiy samara beradi. Chuqur va yiringli yaralarni davolashda bakteritsid omil sifatida tavsiya etiladi. Tibbiyotda

shamollashga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Stomatologiya amaliyotida ham malham bo'la oladi. Spirtli tindirmasi parodontoz, stomatit va boshqa og'iz bo'shlig'i xastaliklarida yaxshi naf keltiradi. Damlamalari yordamida yuqori qon bosimi (gipertoniya) va oshqozon yarasi xastaligidan qiynalganlar shifo topishi mumkin. Yapon soforasi gullaridan olingan dori omillari keng ko'lamda ishlatiladi. Bod (revmatizm), nurlanish xastaligida, diabetda, glomerulonefrit, trombopenit xastaliklarida shifo bag'ishlaydi.

Lupin o'simligi urug'i va donining tarkibida vitaminlar (A, B, C), makro va mikroelementlar, urug'larida oqsil (50%), yog' (20% gacha), protein (glikoprotein), va antioksidantlarning borligi tufayli diabet, asab kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, yallig'lanish, jigar, taloq, yurak-qon tomir kasalliklarini davolashga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI:

Yapon saforasi bargi va mevasi, Lupin o'simligining doni aralshmasidagi antioksidantlik miqdori tekshirilganda, eng yuqori antioksidantlik miqdori 1:1 nisbatdagi aralashmada tashkil topdi, va ushbu nisbatdagi aralashmadan foydalanib "As Lupinus" nomli biologik faol modda yaratildi. O'zbekiston hududida uchraydigan xar ikki o'simlik dukkakkililar oilasiga mansub bo'lib, ilmiy tibbiyotda va xalq tabobatida keng foydalanib kelinayotdan o'simliklar qatoridan joy olgan. Natijalarga ko'ra eng yuqori antioksidantlik chiqqan 1:1 nisbatdagi qo'shilmadan foydalanib, Ilmiy tibbiyot va xalq tabobatini uyg'unlashtirgan holda bu o'simliklar antioksidant yallig'lanishga qarshi, diabet, asab kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, oshqozon ichak yallig'lanishi, jigar, taloq,

yurak-qon tomir kasalliklarini va ko'plab kasalliklarni oldini olishda va davolashda yordam beruvchi oziq-ovqat qo'shilmalarini ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiiq etish uchun "As Lupinus" nomli biologik faol moddasining tarkibidagi umumiy oqsillar miqdori aniqlandi.

Umumiy oqsillar miqdorini aniqlash usullaridan biri Keldal usulidir. Bu bo'yicha azot miqdorini aniqlash orqali umumiy oqsil miqdori hisoblashdan iborat. Usulning mohiyati namunadagi organik moddalarni konsentrlangan sulfat kislotasi yordamida gidroliz qilib (oqsil tarkibidagi amin guruhlarini) ammoniy sulfat tuzlarini hosil qilishdan iborat.

Gidroliz tugaganidan so'ng hosil bo'lgan ammoniy sulfat ammiakga aylantirish uchun natriy gidroksid ta'sir ettirildi.

Neytrallanish natijada hosil bo'lgan ammiak yoki ammoniy gidroksid sulfat kislota eritmasiga yuttiriladi.

Qolgan kislota ishqor eritmasi bilan titrlanadi. Hisoblab topilgan ammiak miqdoridan azot miqdori hisoblanadi. O'rganilayotgan namunaning o'rtacha maydalangan bir jinsli namunasidan probirkaga tahlil qilish uchun aniq namuna tortiladi, xatolik darajasi 0.1% dan oshmasligi kerak. Namuna miqdoriy jihatdan Kel'dal kolbasida o'tkaziladi. Keyinchalik tajriba davomi ko'rsatmaga muvofiq amalga oshiriladi.

TADQIQOT NATIJALARI:

Olingan natijalarni qayta ishlash: tahlil qilinayotgan namunadagi azotning (X) massa ulushi ammiakni suyultirilgan

sulfat kislotadan o'tkazib qolgan miqdorni titrlashdan keyingi hajm orqali namuna massasiga nisbatan foizda formula bo'yicha hisoblab topiladi.

$$X = \frac{(V_1 - V_0) * K * 0.0014}{m} * 100\%$$

V_0 -namuna tajribasida ortib qolgan 0.1 mol/l sulfat kislota eritmasini titrlash uchun sarflangan 0.1mol/l natriy gidroksid eritmasining hajmi, ml.

№	Namuna	Azot miqdori (%)	Umumiy oqsillar miqdori %
1	1:1 Aralashma	4,03	25,2

Введение: Белки можно получать не только из мяса и молочных продуктов, но и из растений. Это помогает похудеть и устранить проблемы со здоровьем. Белки обеспечивают иммунное развитие, передачу нервных импульсов, рост, развитие и регенерацию клеток. Кроме того, он хорошо насыщает живот. В общем, без них невозможно жить. В растениях белки содержатся в гораздо меньших количествах, чем в мясе и молочных продуктах. Тем не менее, состав растительных белков состоит из набора незаменимых аминокислот, что означает, что он может частично или полностью удовлетворить потребности организма в белках. Часто люди, пытающиеся избавиться от лишнего веса, отказываются от животных белков. Растительная пища,

XULOSA: Yapon saforasi va Lupin o'simliklarining 1:1 nisbatdagi qo'shilmasidan "As Lupinus" nomli biologik faol qo'shilma yaratildi. "As Lupinus" biologik faol qo'shilmasining tarkibidagi umumiy oqsillar miqdori aniqlanganda yuqori ko'rsatkichda 25,2 % da aniqlandi. Natijalarga ko'ra 1:1 nisbatdagi qo'shilmadan foydalanib, Ilmiy tibbiyot va xalq tabobatini uyg'unlashtirgan holda bu o'simliklar antioksidant yallig'lanishga qarshi, diabet, asab kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, oshqozon ichak yallig'lanishi, jigar, taloq, yurak-qon tomir kasalliklarini va ko'plab immuntaqisligidan kelib chiqadigan kasalliklarni oldini olishda va davolashda yordam beruvchi oziq-ovqat qo'shilmalarini ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiiq etish tavsiya etiladi.

как правило, содержит меньше калорий и жира, поэтому большинство людей выбирают именно ее.

Но в долгосрочной перспективе может возникнуть дефицит белков из-за диеты только с овощами. Поэтому употребление растительных белков — залог похудения без ущерба для здоровья. Многие превращаются из жалости к животным в вегетарианцев. Человеческий организм может жить без мяса или продуктов животного происхождения, но не может жить без белков. Вот почему те, кто выбирает растительную диету, получают их из других источников.

Анализ литературы: Сафлор японский, или STIFNOLOBIUM Japonica (лат. *Styphnolóbium*

jarónicum) листопадное дерево; вид рода стифнолобиум (*styphnolobium*) семейства Бобовые (*fabaceae*). Дерево высотой до 25 м с широкой шаровидной кроной. Цветет ежегодно в июле-августе. Плод-сочная, нераскрытая цилиндрическая фасоль длиной 3-8 см с прозрачным утолщением, сначала зеленовато-коричневая, а при созревании красноватая. Плоды созревают на всем дереве в сентябре-октябре. Содержит рутин, гликозиды, вяжущие вещества, алкалоиды, органические кислоты, медикамент-лекарство — С (аскорбиновая кислота). Семена содержат 10% жирного масла. Препарат "рутин" получают из почек. Концентрация сахара в нектаре софоры составляет в среднем 50%. В нектаре много глюкозы.

Люпин (от латинского слова *Lupinus*, что означает волк) - род однолетних, двулетних и многолетних корневищных растений семейства бобовых. Травянистых больше, кустарников меньше. Этот вид растений насчитывает от 200 до 1000 различных экземпляров (по разным данным) и растет в разных частях света, чаще всего встречается в Северной Америке и Средиземноморье. В Узбекистане выращивают устрицы на коллекционных плантациях. Корень читается. Стебель травянистый, ветвистый, достигает в высоту до 1,5 м. Лист лапчатый, крупный, полосатый. Опясывающий лишай. Желтый цветок люпина ароматный. Окраска цветка в зависимости от вида варьирует. Плод-многосемянный стручок.

В народной медицине софора японская оказывает положительное действие при повышенном артериальном давлении, при язве кишечника, желудка (желудка) и двенадцатиперстной кишки, при внутренних кровотечениях. Рекомендуются как бактерицидный фактор при лечении глубоких и гнойных ран. В медицине считается эффективным средством от простуды. В

стоматологической практике также может быть мазь. Спиртовая настойка приносит хорошую пользу при пародонтозе, стоматите и других заболеваниях полости рта. С помощью настойки можно вылечить тех, кто страдает от высокого кровяного давления (гипертонии) и язвенной болезни. Лекарственные факторы, полученные из цветков софоры японской, широко используются. Дает исцеление при БПК (ревматизме), лучевой болезни, сахарном диабете, гломерулонефрите, тромбопение.

Семена и злаки растения люпин содержат витамины (А, В, С), макро-и микроэлементы, белок (50%), жир (до 20%), белок (гликопротеин), а благодаря наличию в семенах антиоксидантов, они помогают при диабете, нервных расстройствах, заболеваниях суставов, воспалениях, заболеваниях печени, селезенки, сердечно-сосудистой системы. помогает вылечить болезни.

Методика исследования: При исследовании содержания антиоксидантов в смеси листьев и плодов сафлора японского, злаков растения Люпин было установлено наибольшее содержание антиоксидантов в смеси в соотношении 1: 1, и с помощью смеси в этом соотношении было создано биологически активное вещество под названием "As Lupinus". Оба растения, встречающиеся на территории Узбекистана, относятся к семейству бобовых и относятся к числу растений, широко используемых в научной медицине и народной медицине. Комбинируя научную медицину и народную медицину, используя соединение в соотношении 1:1, из которого получен самый высокий уровень

Introduction: Proteins can be obtained not only from meat and dairy products, but also from plants. It helps to lose weight and eliminate health problems. Proteins provide immune development, transmission of nerve impulses, growth, development and regeneration of cells. In addition, it nourishes the stomach well. In general, it is impossible to live without them. In plants, proteins are found in much smaller quantities than in meat and dairy products. However, the composition of plant proteins consists of a set of essential amino acids, which means that it can partially or completely meet the body's protein needs. Often people trying to get rid of excess weight give up animal proteins. Plant-based foods tend to contain fewer calories and fat, which is why most people choose them.

But in the long run, there may be a protein deficiency due to a diet with only vegetables. Therefore, the use of vegetable proteins is the key to losing weight without compromising health. Many turn into vegetarians out of pity for animals. The human body can live without meat or animal products, but it cannot live without proteins. That's why those who choose a plant-based diet get them from other sources.

Literature analysis: Japanese safflower, or STIFNOLOBIUM Japonica (Latin *Styphnolobium japonicum*) is a deciduous tree; a species of the genus *styphnolobium* (*styphnolobium*) of the Legume family (*fabaceae*). A tree up to 25 m tall with a wide spherical crown. It blooms annually in July and August. The fruit is a juicy, unopened cylindrical bean 3-8 cm long with a transparent thickening, greenish-brown at first, and reddish when ripe. The fruits ripen on the whole tree in September-October. It contains rutin, glycosides, astringents, alkaloids, organic acids, medicine-medicine — C (ascorbic acid). The seeds contain 10% fatty oil. The drug "rutin" is obtained from the kidneys. The sugar concentration in sophora

nectar averages 50%. There is a lot of glucose in the nectar.

Lupin (from the Latin word *Lupus*, which means wolf) is a genus of annual, biennial and perennial rhizomatous plants of the legume family. There are more grassy areas and fewer shrubs. This plant species has from 200 to 1000 different specimens (according to various sources) and grows in different parts of the world, most often found in North America and the Mediterranean. In Uzbekistan, oysters are grown on collection plantations. The root is readable. The stem is herbaceous, branched, reaches a height of up to 1.5 m. The leaf is paw-like, large, striped. Shingles. The yellow lupine flower is fragrant. The color of the flower varies depending on the species. The fruit is a multi-seeded pod.

In folk medicine, Japanese sophora has a positive effect on high blood pressure, ulcers of the intestine, stomach (stomach) and duodenum, and internal bleeding. It is recommended as a bactericidal factor in the treatment of deep and purulent wounds. In medicine, it is considered an effective remedy for colds. There may also be ointment in dental practice. Alcohol tincture is of good benefit for periodontal disease, stomatitis and other diseases of the oral cavity. With the help of tincture, you can cure those who suffer from high blood pressure (hypertension) and peptic ulcer disease. Medicinal factors derived from the flowers of *sophora japonica* are widely used. It gives healing for BOD (rheumatism), radiation sickness, diabetes mellitus, glomerulonephritis, thrombopenitis.

Seeds and cereals of the lupin plant contain vitamins (A, B, C), macro- and microelements, protein (50%), fat (up to 20%), protein (glycoprotein), and due to the presence of antioxidants in seeds, they

help with diabetes, nervous disorders, joint diseases, inflammation, liver diseases, spleen, cardiovascular system. it helps to cure diseases.

Research methodology: When studying the content of antioxidants in a mixture of leaves and fruits of Japanese safflower, cereals of the Lupin plant, the highest content of antioxidants in the mixture was found in a ratio of 1: 1, and with the help of a mixture in this ratio, a biologically active substance called "As Lupinus" was created. Both plants found in Uzbekistan belong to the legume family and are among the plants widely used in scientific medicine and folk medicine. Combining scientific medicine and traditional medicine, using a compound in a 1:1 ratio, from which the highest level of antioxidants is obtained according to the results, these plants are antioxidant anti-inflammatory drugs, dietary supplements that help prevent and treat diabetes, neurological diseases, joint diseases, inflammation of the gastrointestinal tract, liver, spleen, cardiovascularvascular diseases and many diseases. For production and implementation, the content of total proteins in a biologically active substance called "As Lupinus" was determined.

One of the methods for determining the total number of proteins is the Keldal method. It consists of calculating the total amount of protein by determining the amount of nitrogen in it. The essence of the method is the hydrolysis of organic substances of the sample using concentrated sulfuric acid (amino group in protein) to form ammonium sulfate salts.

Sodium hydroxide was exposed to convert ammonium sulfate formed after completion of hydrolysis into ammonia.

Neutralization is carried out in the resulting solution of ammonia sulfuric acid or ammonium hydroxide.

The remaining acid is titrated with an alkali solution. The amount of nitrogen is calculated from the calculated amount of ammonia. A clean sample is weighed from an

average ground homogeneous sample of the test sample into a test tube for analysis with an error of no more than 0.1%. The sample is quantitatively transferred to the Keldal flask. Further continuation of the experiment is carried out according to the instructions.

Results of the study: Processing of the results obtained: the mass fraction of nitrogen (x) in the analyzed sample is determined by passing ammonia through dilute sulfuric acid as a percentage of the mass of the sample by volume after titration according to the formula.

$$X = \frac{(V_1 - V_0) * K * 0.0014}{m} * 100\%$$

V0 is the volume of 0.1 mol/l of sodium hydroxide solution spent on titration of 0.1 mol/l of sulfuric acid solution exceeded in the experiment with the sample, ml.

№	Sample	Nitrogen content (%)	Total number of proteins %
1	1:1 Mixture	4,03	25,2

Conclusion: A biologically active compound called "As Lupinus" was created from a compound of Japanese safflower and Lupin plants in a ratio of 1:1. The content of total proteins in a biologically active compound" As Lupinus " was determined at 25.2% with an increased index. Combining scientific medicine and traditional medicine, using a compound in a 1:1 ratio according to the results, these plants have an antioxidant anti-inflammatory effect, producing dietary supplements that help prevent and treat diabetes, neurological diseases, joint diseases, inflammation of the gastrointestinal tract, liver, spleen, cardiovascular diseases and many

diseases caused by immunodeficiency. It is recommended to exclude it and apply it in practice.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boshqarish usullari. Kimyoviy omillar. Biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalarining sifat nazorati va xavfsizligi bo'yicha qo'llanma. Qo'llanma R 4.1.1672-03. M.: Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati federal markazi, 2004.
2. И.Р Асқаров. Табобат қомуси . Тошкент.- Мумтоз сўз. - 2019.
3. И.Р. Асқаров. Сирли табобат. Тошкент.- Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи, 1010, 2021.
4. И.Р. Асқаров. Фитотерапия. Тошкент.- Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи, 2023.
5. И.Р. Асқаров. Далилларга асосланган халк табобати усуллари.- Тошкент.-Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи, 2023.
6. Абдужабборова, Ч. С. ЯПОН САФОРАСИ (LAT. STYRHONOLOBИUM JAPONICUM) НИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ТАБОБАТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. *Халк табобати плюс-2023/12.-С*, 47-49.
7. Mamatqulova, S. A., & qizi Abdujabborova, C. S. (2024). LYUPIN O'SIMLIGI KIMYOVIY TARKIBI VA XALK TABOVATIDA QO'LLANILISHI. *Educational research in universal sciences*, 3(3), 73-79.
8. Gulomova, N. S. (2023). КОЛЮЧЕЛИСТНИК, ТУРКЕСТАНСКИЙ МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(12), 178-183.
Абдужабборова, Ч. С. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮПИНА В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И РЕЦЕПТАХ. "Fizikaviy va kolloid kimyo fanlarining fundamental va amaliy muammolari hamda ularning innovatsion yechimlari" Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
9. Асқаров И.Р. Товарлар кимёси (Монография). Фан ва технологиялар Марказининг босмаҳонаси. -Тошкент - 2019. -1000 б.
10. Воробьев, А. Е., Мамасидов, Д. Т., Воробьев, К. А., & Абдужабборова, Ч. С. БИОТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ. Монография. *Фергана: "Classic"-2024.-210 с.*
11. Mamatqulova, S. A., and Charosxon Sanjarbek qizi Abdujabborova. "LYUPIN O'SIMLIGI KIMYOVIY TARKIBI VA XALK TABOVATIDA QO'LLANILISHI." *Educational research in universal sciences* 3.3 (2024): 73-79.
12. Askarov, I. R., & Gulomova, N. S. (2023). CHEMICAL COMPOSITION OF SAMBUCUS NIGRA AND ITS ROLE IN FOLK MEDICINE. В INTERNATIONAL BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL RESEARCH (Т. 3, Выпуск 12, сс. 16–20). Zenodo.
13. Jumanova, B. (2023). CHEMICAL COMPOSITION OF THE MARMARAK MEDICINAL PLANT (SALVIA OFFICINALIS) AND USE IN PEOPLE'S MEDICINE. *Академические исследования в современной науке*, 2(26), 158-162.