



UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljournal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 1

Published: 06.01.2025
<https://universaljournal.uz>



International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

ORBITA TENGLAMASINING KELIB CHIQISHINING BIR NECHTA USULLARI

**Xudoyberdiyeva Malika Karomat qizi^a, Doniyorov Nodirjon Olimjon o'g'li^b,
Amatboyev Temur Otamurod o'g'li^d**

^(a)O'zbekiston Milliy Universiteti., Fizika fakulteti katta o'qituvchisi, PhD

^(b)O'zbekiston Milliy Universiteti., Fizika fakulteti 1-kurs talabasi

^(d)O'zbekiston Milliy Universiteti., Fizika fakulteti 1-kurs talabasi

Uzbekistan

xudoyberdiyeva94@inbox.ru

<https://orcid.org/0009-0006-8812-5028>

Annotatsiya: Orbital tenglamalar matematik fizikaning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, ular osmon mexanikasida va sun'iy yo'ldoshlar harakatini o'rganishda keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada orbital tenglamalarning kelib chiqishi va ularni chiqarishning turli usullari ko'rib chiqiladi. Asosiy diqqat e'tibori Nyutonning tortishish qonuni va Kepler qonunlaridan foydalanishga, shuningdek, zamonaviy matematik va sonli usullar yordamida orbital harakatni modellashtirishga qaratilgan. Shuningdek, maqolada klassik va zamonaviy yondashuvlarning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot orbital harakatlarni chuqurroq tushunish va turli sohalarda qo'llash imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kosmik tezliklar, birinchi kosmik tezlik, ikkinchi kosmik tezlik, uchinchi kosmik tezlik, trayektoriya, gravitatsiya qonuni, Kepler qonunlari.

Аннотация: Орбитальные уравнения являются важной частью математической физики и широко применяются в небесной механике и изучении движения искусственных спутников. В

данной статье рассматривается происхождение орбитальных уравнений и различные методы их вывода. Основное внимание уделено использованию закона всемирного тяготения Ньютона и законов Кеплера, а также моделированию орбитального движения с помощью современных математических и численных методов. Также обсуждаются преимущества и недостатки классических и современных подходов. Это исследование направлено на углубление понимания орбитальных движений и расширение возможностей их применения в различных областях.

Ключевые слова: космические скорости, первая космическая скорость, вторая космическая скорость, третья космическая скорость, траектория, закон гравитации, законы Кеплера.

Abstract: Orbital equations are a significant aspect of mathematical physics and are widely used in celestial mechanics and the study of artificial satellite motion. This article explores the origin of orbital equations and various methods for deriving them. The primary focus is on the application of Newton's law of universal gravitation and Kepler's laws, as well as the modeling of orbital motion using modern mathematical and numerical methods. Additionally, the advantages and disadvantages of classical and contemporary approaches are discussed. This research aims to enhance the understanding of orbital motions and broaden their applications across various fields.

Keywords: cosmic velocities, first cosmic velocity, second cosmic velocity, third cosmic velocity, trajectory, law of gravitation, Kepler's laws.

Language: Uzbek

Citation: Khudoyberdiyeva, M., Doniyorov, N., & Amatboyev, T. (2025). SOME METHODS OF DERIVING THE ORBITAL EQUATION. Universal International Scientific Journal, 2(1), 23–29. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1395>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14614632>

Google scholar: <https://scholar.google.co.in/scholar?q=https://inlibrary.uz/index.php/universaljournal/article/view/60317>

KIRISH

ORBITA TENGLAMASINI

KELTIRIB CHIQRISH: 1-USUL

Kosmik tezliklar tushunchasi biror jismning yer tortish kuchidan chiqib ketishi yoki orbitada harakatlanishi uchun zarur bo'lgan minimal tezliklarni tavsiflaydi. Ushbu tezliklar uchta turga bo'linadi: birinchi kosmik tezlik (sun'iy yo'ldosh

tezligi), ikkinchi kosmik tezlik (qochish tezligi) va uchinchi kosmik tezlik (quyosh tizimidan chiqish tezligi). Bu tezliklarni to'g'ri aniqlash va hisoblash kosmik missiyalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun juda muhimdir.

To'la energiya o'zgarmaydi va u kinetik va potensial energiyalar yig'indisiga teng:

$$E = \frac{\mu v^2}{2} - \frac{Gm_1 m_2}{r} \qquad \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{\mu r^2} \qquad (6)$$

(1)

Kinetik energiya $\frac{\mu v^2}{2}$ ifodasi massa μ va ikki jismning nisbiy tezligi v orqali yoziladi. Qutb koordinatalar sistemasini shunday tanlaymizki:

$$\vec{v} = v_r \hat{r} + v_\theta \hat{\theta}$$

$$v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$$

(2)

bu yerda $v_r = dr / dt$ va $v_\theta = r (d\theta / dt)$. Bundan (1) tenglama quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$E = \frac{1}{2} \mu \left[\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \left(r \frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] - \frac{Gm_1 m_2}{r}$$

(3)

O nuqtaga nisbatan impuls momenti

$$\vec{L}_O = \vec{r}_O \times \mu \vec{v} = r \hat{r} \times \mu (v_r \hat{r} + v_\theta \hat{\theta}) = \mu r v_\theta \hat{k} = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \hat{k} = L \hat{k} \qquad (4)$$

Uning miqdori

$$L = \mu r v_\theta = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \qquad (5)$$

Biz (5) tenglamadagi ifodadan foydalangan holda (3) tenglamadan θ ga bog‘liqlikni aniq tarzda yo‘q qilamiz.

(3) tenglamada ifodalangan to‘la mexanik energiya quyidagicha yoziladi

$$E = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r^2} - \frac{Gm_1 m_2}{r}$$

(7)

(7) tenglama ajratiladigan differensial tenglama bo‘lib, r o‘zgaruvchili t vaqt funksiyasi sifatida ishtirok etadi va birinchi hosila dr/dt uchun yechilishi mumkin.

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{\mu}} \times \left(E - \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r^2} + \frac{Gm_1 m_2}{r} \right)^{\frac{1}{2}}$$

(8)

(8) tenglama qonuniy jihatdan $r(t)$ uchun bevosita integrallanishi mumkin. Keyin $r(t)$ funksiyani qonuniy ravishda (5) tenglamaga almashtirish mumkin va keyin $\theta(t)$ ni topish uchun integrallash mumkin..Yakka jismning vaqt funksiyasidagi holatini yechish o‘rniga, $r(\theta)$ topib, orbitaning geometrik tavsifini topamiz. Avval (5) tenglamani (7) tenglamaga ajratamiz.

$$\frac{d\theta}{dr} = \frac{\frac{d\theta}{dt}}{\frac{dr}{dt}} = \frac{L}{\sqrt{2\mu}} \times \frac{\frac{1}{r^2}}{\left(E - \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{Gm_1 m_2}{r} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

(9)

O'zgaruvchilar r va θ ajraladi

$$d\theta = \frac{L}{\sqrt{2\mu}} \times \frac{\frac{1}{r^2}}{\left(E - \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{Gm_1 m_2}{r}\right)^{\frac{1}{2}}} dr \quad (10)$$

Keyinchalik aniq natijaga erishish uchun matematikada qulay almashtirishlarni tanlashga imkon beruvchi yaxshi ko'rinishni o'z ichiga oladi. Birinchidan, r ning o'zaro ta'sirining ko'plab omillariga e'tibor bering. Shunday qilib, biz $u=1/r$ almashtirishni sinab ko'ramiz. $du=-1/r^2 dr$, natija bilan

$$d\theta = -\frac{L}{\sqrt{2\mu}} \frac{du}{\left(E - \frac{L^2}{2\mu} u^2 + Gm_1 m_2 u\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (11)$$

Integrallarni baholash tajribasi shuni ko'rsatadiki, kvadrat ildiz ichidagi u^2 ko'paytiruvchi omilning mutlaq qiymatini birlikka tenglashtiramiz. Ya'ni, surat va maxrajni $\frac{\sqrt{2\mu}}{L}$ ga ko'paytirish,

$$d\theta = -\frac{du}{\left(\frac{2\mu E}{L^2} - u^2 + 2\left(\frac{\mu Gm_1 m_2}{L^2}\right)u\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (12)$$

Keyingi qadamlar uchun tekshirish sifatida, (12) tenglamasidagi chap tomondagi $d\theta$ kattaligi o'lchamsiz ekanligini qayd etamiz, shunday qilib, o'ng

tomon ham o'lchamsiz bo'lishi kerak. Bu esa, kvadrat ildiz ichidagi $\frac{1}{2}\mu Gm_1 m_2 L$ ko'paytuvchisi u bilan bir xil o'lchamga ega bo'lishini, ya'ni $1/\text{uzunlik}$ bo'lishini anglatadi. Shunday qilib $r_0^2 = \frac{L^2}{\mu Gm_1 m_2}$. Bu esa albatta, (10) tenglamasida aniqlangan fokusga nisbatan yon chiziq uzunligi bo'ladi. Shundan so'ng differensial tenglama quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi

$$d\theta = -\frac{du}{\left(\frac{2\mu E}{L^2} - u^2 + \frac{2u}{r_0}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (13)$$

Endi biz eksentrisitet shartlarini ifodalash uchun maxrajni qayta yozamiz.

$$\begin{aligned} d\theta &= -\frac{du}{\left(\frac{2\mu E}{L^2} + \frac{1}{r_0^2} - u^2 + \frac{2u}{r_0} - \frac{1}{r_0^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \\ &= -\frac{du}{\left(\frac{2\mu E}{L^2} + \frac{1}{r_0^2} - \left(u - \frac{1}{r_0}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \\ &= -\frac{r_0 du}{\left(\frac{2\mu E r_0}{L^2} + 1 - (r_0 u - 1)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (14) \end{aligned}$$

Shuni qayd etamizki, $\frac{2\mu E r_0}{L^2} + 1$ kabi terminlar o'lchamsiz bo'lib, aslida eksentrisitetning kvadrati e^2 ga teng (bu (12) tenglamasida aniqlangan yana bir

“keyinchalik aniqlangan” xususiyat). Shundan so‘ng, (14) tenglamasining oxirgi ifodasi quyidagicha bo‘ladi

$$d\theta = -\frac{r_0 du}{(e^2 - (r_0 u - 1)^2)^{\frac{1}{2}}} \quad (15)$$

Bu yerdan biz bir necha hisoblash qadamlarini birlashtirib, darhol almashtirishga o‘tamiz. $r_0 u - 1 = e \cos \alpha$, $r_0 du = -e \sin \alpha d\alpha$, yakuniy natija bilan

$$d\theta = -\frac{-e \sin \alpha d\alpha}{(e^2 - e^2 \cos^2 \alpha)^{\frac{1}{2}}} = d\alpha \quad (16)$$

Endi biz tenglamani integrallaymiz. (16) juda oddiy natija bilan

$$\theta = \alpha + const$$

Konstantani tanlashda bizda tanlov bor va agar tanlasak, $\theta = \alpha - \pi$, $\alpha = \theta + \pi$,


$\cos \alpha = -\cos \theta$, natijada

$$r = \frac{1}{u} = \frac{r_0}{1 - e \cos \theta} \quad (17)$$

Bu biz xohlagan tenglama kelib chiqdi. E’tibor bering, agar biz integral konstantasini nolga teng qilib tanlasak, natija

$$r = \frac{1}{u} = \frac{r_0}{1 + e \cos \theta} \quad (18)$$

Bu 1-rasmdagi “vertikal” o‘q atrofida aks ettirilgan bir xil traektoriya, haqiqatan ham π aylanish bilan bir xil.



1-rasm Yagona jism orbitasining koordinatalar sistemasi

ORBITA TENGLAMASINI

KELTIRIB CHIQRISH: 2-USUL

(17) tenglama quyidagi shaklda keltirib chiqarilgan

$$u = \frac{1}{r_0} (1 - e \cos \theta) \quad (19)$$

Oddiy differensial tenglamani olish uchun bir jisimli masala uchun harakat tenglamasini manipulyatsiya qilish mumkinligini ko‘rsatadi. Ya’ni, quyidagidan boshlaymiz

$$\vec{F} = \mu \vec{a}$$

$$-\frac{Gm_1 m_2}{r^2} \hat{r} = \mu \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \hat{r} \quad (20)$$

Komponentlarni tenglashtirib, harakatning saqlanish doimiysi $L = \mu r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)$ dan foydalangan holda va uni qayta

tartiblaganda, (20) tenglama quyidagiga aylanadi

$$\mu \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{L^2}{\mu r^3} - \frac{Gm_1 m_2}{r^2} \quad (21)$$

Endi biz bir xil almashtirish $u=1/r$ dan foydalanamiz va (21) tenglama ikkinchi tartibli tenglama bo'lgani uchun zanjir qoidasidan ikki marta foydalanib, mustaqil o'zgaruvchini t dan r ga o'zgartiramiz. Bu birinchi tartibli hosila hisoblanadi

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{du} \frac{du}{dt} = \frac{dr}{du} \frac{du}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$$

$r = \frac{1}{u}$ ifodasi orqali $\frac{dr}{du} = -\frac{1}{u^2}$ ekanligini olamiz. Bu ifodani $d\theta/dt$ ni L va u yordamida ifodalangan holda birlashtiramiz:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{Lu^2}{\mu}$$

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \frac{Lu^2}{\mu} = -\frac{du}{d\theta} \frac{L}{\mu} \quad (22)$$

Endi vaqt bo'yicha ikkinchi hosilani olamiz:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right) = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{dr}{dt} \right) \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{d^2 u}{d\theta^2} \left(u^2 \frac{L^2}{\mu^2} \right) \quad (23)$$

Shundan so'ng (21) tenglamaga $r=1/u$ ni qo'yish orqali quyidagi natija olinadi

$$-\frac{d^2 u}{d\theta^2} u^2 \frac{L^2}{\mu} = \frac{L^2}{\mu} u^3 - Gm_1 m_2 u^2$$

Tenglamaning ikkala tarafidan u^2 ni qisqartirib, qayta tartibga solib, biz bunga erishamiz

$$-\frac{d^2 u}{d\theta^2} = u - \frac{\mu Gm_1 m_2}{L^2} \quad (23)$$

(23) tenglama qo'shimcha doimiy hadli oddiy garmonik tebranishlar tenglamasiga matematik jihatdan ekvivalentdir. Yechim ikki qismdan iborat: burchakka bog'liq bo'lmagan yechim

$$u_0 = \frac{\mu Gm_1 m_2}{L^2}$$

va burchakka sinusoidal ravishda bog'liq o'zgaruvchan yechim

$$u_g = A \cos(\theta - \theta_0) \quad (24)$$

Bu yerda A va θ_0 orbita shakli bilan belgilangan konstanatalardir. (24) tenglamadagi ifoda bir jinsli bo'lmagan yechim bo'lib, aylana orbitani ifodalaydi. (17) tenglamadagi ifoda bir xil yechimdir (pastki belgisida ko'rsatilganidek) va ikkita mustaqil konstantaga ega bo'lishi kerak. Biz $1/u_0$ ni fokusga nisbatan yon chiziq

uzunligi r_0 deb osongina aniqlashimiz mumkin, natijada bu

$$u = u_0 + u_g = \frac{1}{r_0} (1 + r_0 A \cos(\theta - \theta_0))$$

⇒

$$r = \frac{1}{u} = \frac{r_0}{1 + r_0 A \cos(\theta - \theta_0)}$$

Xulosa

Orbital tenglamalarning kelib chiqishi va ularni chiqarishning turli usullarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu masala nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Klassik

yondashuvlar (Nyuton qonunlari va Kepler qonunlari) soddaligi va intuitivligi bilan ajralib tursa, zamonaviy usullar (numerik modellashtirish va kompyuter dasturlari yordamida) aniqlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Har bir usul o'zining maxsus sharoitlari va qo'llanish doirasiga ega bo'lib, ularni tanlash masalasi tadqiqotning maqsadi va sharoitlariga bog'liq. Ushbu maqolada keltirilgan natijalar orbital harakatlarni o'rganishda nazariy va amaliy yondashuvlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur mavzuni yanada chuqurroq o'rganish kelgusida yangi texnologiyalarni rivojlantirishga yo'l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. V. A. Belinsky, I. M. Khalatnikov, and E. M. Lifshitz, *Adv. Phys.* 19, 525 (1970).
2. V. A. Belinskii, I. M. Khalatnikov, and E. M. Lifshitz, *Advances in Physics* 19, 525 (1970).
3. C. W. Misner, *Physical Review Letters* 22, 1071 (1969).
4. K. C. Jacobs, *Astrophysical Journal*, vol. 153, p. 661 153, 661 (1968).
5. A. Ashtekar and P. Singh, *Class. Quant. Grav.* 28, 213001 (2011), arXiv:1108.0893.
6. P. Singh, *Bull. Astron. Soc. India* 42, 121 (2014), arXiv:1509.09182.
7. B.-F. Li and P. Singh, (2023), arXiv:2304.05426.
8. A. Ashtekar, T. Pawlowski, and P. Singh, *Phys. Rev. Lett.* 96, 141301 (2006), arXiv:gr-qc/0602086.
9. A. Ashtekar, T. Pawlowski, and P. Singh, *Phys. Rev. D* 74, 084003 (2006), arXiv:gr-qc/0607039.
10. A. Ashtekar, A. Corichi, and P. Singh, *Phys. Rev. D* 77, 024046 (2008), arXiv:0710.3565.